Oxidan Extra

Biocider skal anvendes på forsvarlig vis.
Læs altid mærkningen og produktoplysningerne før anvendelse.

PRODUKTTYPE
Surt desinfektionsmiddel

ANVENDELSE
Oxidan Extra anvendes til desinfektion af overflader og udstyr inden levnedsmiddelindustrien, farmaceutisk industri, landbruget samt transportsektoren.

EGENSKABER
Oxidan Extra er et bredspektret og hurtigtvirkende desinfektionsmiddel indeholdende 5 % pereddikesyre. Er virksomt ved lave temperaturer og kan derfor anvendes i koldt vand.
Pereddikesyre nedbrydes til vand, ilt og eddikesyre og bioakkumuleres ikke.
Biocid effekt: Baktericid, fungicidt (gærsvampe), fungicid, sporicidt og virucid.

OPBEVARING
Opbevares i tætlukket originalemballage på et tørt, køligt og godt ventileret sted. Må ikke opbevares sammen med fødevarer, drikkevarer og foderstoffer. Opbevares adskilt fra: Klor og Baser. Oxiderende materiale. Holdes adskilt fra brandfarligt og brændbart materiale. Beskyttes mod direkte sollys.
Opbevaringstemperatur: -10 - 30 °C
Holdbarhed: 24 måneder.

GODKENDELSE
Desinfektionsmiddel godkendt af Fødevarestyrelsen under J.nr.: 1.5571-172/91.

Kun til erhvervsmæssig brug

SIKKERHED
Se venligst etiket og sikkerhedsdatablad for oplysninger om sikkerhedsforhold, håndtering og transport af produktet.

Dette produkt er omfattet af EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EU) 2019/1148 af 20. juni 2019 om markedsføring og anvendelse af udgangsstoffer til eksplosivstoffer.Køb af produktet kræver indsendelse af erklæring til leverandøren.

MILJØFORHOLD
Produktet er meget giftig for organismer, der lever i vand; kan forårsage uønskede langtidsvirkninger i vandmiljøet.
Store mængder af produktet kan påvirke surhedsgraden (pH-værdien) i vandmiljøet med risiko for skadevirkninger for vandorganismer.
Produktet er biologisk letnedbrydeligt.
Produktet er vandopløseligt og kan spredes i vandmiljøet.
Ingen dokumentation for hormonforstyrrende egenskaber.

BORTSKAFFELSE
Må ikke tømmes i kloakafløb, aflever dette materiale og dets beholder til et indsamlingssted for farligt affald og problemaffald. Spild og rester bortskaffes i overensstemmelse med kommunens affaldsregulativer. Emballagen må ikke genbruges.

BRUGSANVISNING OG DOSERING

Dosering: 0,15 – 7,5%.
Temperatur: 4-40°C.
Kontakttid:
CIP og overflader: 5-15 minutter.

Kassevask: Afhængig af maskintype og applikation kan tilfredsstillende effekt opnås ved kortere indvirkningstid.

Det anbefales, at overflader, som kommer i forbindelse med fødevarer, skylles med drikkevand efter endt desinfektion.

Kontakt din Novadan konsulent for nærmere anvisning om dosering og brugsanvisning.

PRODUKTDATA

Farve			Farveløs
Tilstandsform			Flydende
Lugt			Skarp
Vægtfylde			~1,10 kg/l
pH	I leveringstilstand		~ 1,0
	I vandig opløsning	1 %	~ 4,0
	I vandig opløsning	0,2 %	~ 5,5

TITRERING

Afmål 10 ml af brugsopløsningen
Tilsæt ca. 5 ml 25% svovlsyre / Titrer med 0,1 N Kaliumpermanganat til rød farve.
Koncentration = Forbrugt ml Kaliumpermanganat x faktor
Titrer forsigtigt til reaktionen er igang

Faktor (w/w %):	0,04
(v/v %):	0,04

DK: Platinvej 21, DK-6000 Kolding
Tlf: +45 76 348 400

EMBALLAGE	Dunk	10 L, 20 L
	Plasttromle	200 L
	IBC	1000 L

DK: Platinvej 21, DK-6000 Kolding
Tlf: +45 76 348 400

NOVADAN®