



МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ "СВЕТА СОФИЯ"

гр. София 1618, бул. „България“ № 104, тел. 02/81 84 630

РЕЗУЛТАТ ОТ ОБРАЗНО – ДИАГНОСТИЧНО ИЗСЛЕДВАНЕ ОТ ОТДЕЛЕНИЕ ПО ОБРАЗНА ДИАГНОСТИКА

Пациент: Светослава Райчева Лазарова, 47г., Ж/Ф, Рег. номер - 213519

Компютъртомографско изследване

Клинична диагноза: Са на пикочен мехур. Ст. пост Ту-ТУР. Ст. пост имунотерапиам интравезикалис. Прогресио - мета ЛН пелвицис ет рец. локалис. Ст. пост химиотерапиам. Ст. пост имунотерапиам. Прогресио - рец. локалис ет ЛН пелвицис. Ст. пост химиотерапиам. ПР. Ст. пост химиотерапиам.

Област на изследване: торакс, абдомен и малък таз

Контраст: нативен и с и.в. контрастна материя

За сравнение - предходно МР изследване от 10/11/2025г.

Торакс:

Аксили - двустранно б.о.

Гръдна стена и меки тъкани – б.о.

Плеврални изливи - не се визуализират.

Бели дробове - без данни за огнищни или инфилтративни лезии. Голяма овална М. лезия в 7ми/8ми сегмент вляво с размер 26/19 мм на база на предходен милиарен нодул (5 мм).

Перикарден излив - не се визуализира.

Патологично уголемени лимфни възли - не се визуализират.

Трахея и бронхи – с нормален калибър, свободно проходими до сегментарно ниво.

Абдомен и малък таз:

Асицт - не се визуализира.

Перитонеално ангажиране - не се визуализира

Лимфни възли - увеличени парааортални лимфни възли до нивото на реналните съдове с размер 28/19/53мм (предходни размери 16/9/23мм) и АХ 21/17 (предходен размер АХ 10,5/5мм).

Новопоявили се л.в. около дясна обща илиачна артерия АХ 21/13 мм.

Увеличени параилиачни л.в. вляво - до 7/16 мм - без значителна динамика.

Черен дроб - нормална форма, размери и плътност на паренхима. Персистира пунктиформена билиарна киста в 4ти В сегмент без динамика. Лезия с характеристика на хемангиом в 6ти сегмент 6,7 мм - не се визуализира.

Интра- и екстрахепаталните жлъчни пътища- недилатирани.

Жлъчен мехур - без КТ данни за литиаза, с тънки стени, хомогенно течноеквивалентно съдържимо.

Слезка - хиподензни лезии с неправилна форма и размер до 11/8 мм - без значима динамика.

Надбъбреци - интактни.

Панкреас – с нормална структура и размери в трите му отдела.

Бъбреци - наложен JJ катетър вляво.

Ту формация ангажираща левия м.псоас, м. илеопсаос и м. илиакус, разполагаща се стенодопирно на левите илиачните съдове. Формацията е с настоящи размери 77/53/71 мм (предходни изследване 64/43/71мм). Лезията деструира подлежащата илиачна кост и маса латерале на сакрума. При настоящото изследване находката е с преобладаващо хиподензна структура (спрямо хетерогенно хиперваскуларна от предходното изследване) - некроза.

Матка - миоматозна.

Пикочен мехур - с нормална дебелина на стените, без пристенни дефекти и нормално съдържимо. В лумена дисталният сегмент на JJ стента.

Ректум и периректална мастна тъкан - интактни.

Заклучение: RECISt - прогресия за сметка на М. пулмонум, М в илеопсоасен мускулу вляво и в лимфни възли (нов момент).

Д-р Р.Тодорова

Д-р Адриана П. Панайотова

20/04/26 год.



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
Европейски фонд
за регионално развитие
Инвестираме във вашето бъдеще



НАЦИОНАЛНА
СТРАТЕГИЧЕСКА
РЕФЕРЕНТНА РАМКА
2007 – 2013



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
„Развитие на конкурентоспособността
на българската икономика” 2007-2013
www.opcompetitiveness.bg