





KARTA INTERPRETACJI WYNIKÓW I ZALECEŃ

dla szybkiego testu na obecność przeciwciał przeciwko koronawirusowi SARS-Cov-2

UWAGA: Wynik badania będzie wysłany SMS-em w terminie maksymalnie pół godziny od wykonania badania. Dokument z pełnym wynikiem badania będzie dostępny Portalu Pacjenta POLMED w terminie do 6 godzin od wykonania badania. W razie pozytywnego wyniku testu, POLMED przesyła wymagane odrębnymi przepisami zgłoszenie do właściwej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej.

WYNIK BADANIA		INTERPRETACJA */	ZALECENIA
	IgM (ujemny), IgG (ujemny) (negatywny)	Brak przeciwciał przeciwko koronawirusowi. Brak zakażenia koronawirusem lub wczesny jego okres (kilka - kilkanaście dni)	Przestrzegaj ogólnych zasad obowiązujących w okresie epidemii.
	IgM (dodatni), IgG (ujemny) (pozytywny IgM)	Kilka - kilkanaście dni temu doszło do zakażenia koronawirusem. Świeże zakażenie.	Zgodnie z wiedzą medyczną, istnieją <u>wskazania do wykonania badania weryfikującego</u> obecność materiału genetycznego koronawirusa SARS-Cov-2 w wydzielinie pobranej metodą wymazu z górnych dróg oddechowych (test molekularny). Kontakt telefoniczny z najbliższym szpitalem - oddziałem chorób zakaźnych i najbliższą Stacją Sanitarno - Epidemiologiczną. Do czasu uzyskania dalszych zaleceń, zadbaj o odizolowanie się od innych, w miarę możliwości korzystaj z maseczki i rękawiczek.
	IgM (dodatni), IgG (dodatni) (pozytywny IgM i IgG)	Świeże lub przebyte zakażenie.	
	IgM (ujemny), IgG (dodatni) (pozytywny IgG)	Prawdopodobnie przebyte zakażenie - możliwe, że osoba badana przeżyła zakażenie i nabyła odporność przeciwko koronawirusowi.	

Powyższe informacje dotyczą osób, które czują się zdrowe (nie mają objawów infekcji układu oddechowego).

Niezależnie od wyniku badania:

- osoby z poważnymi objawami sugerującymi COVID-19 (temperatura ciała >38°C, kaszel z dusznością) powinny założyć maseczkę (w razie niedostępności - chustkę, cienki szalik itp. zakrywające nos i usta) i rękawiczki oraz zgłosić się bezpośrednio do najbliższego szpitala zakaźnego (unikając komunikacji publicznej). W razie narastającej duszności utrudniającej poruszanie się, należy skorzystać z pilnej pomocy medycznej (nr alarmowy 112).
- osoby z łagodnymi (innymi niż w/w) objawami infekcji układu oddechowego powinny skorzystać z telekonsultacji lekarskiej.