

## 1. Bezeichnung des Arzneimittels

dysto-loges® S Tabletten

## 2. Qualitative und quantitative Zusammensetzung

### Wirkstoffe

1 Tablette enthält:	
Passiflora incarnata Ø	13,0 mg
Gelsemium Trit. D4	39,0 mg
Reserpinum Trit. D6	
(HAB, Vorschrift 6)	31,2 mg
Coffea Trit. D6	33,3 mg
Veratrum (HAB 34) Trit. D6	
[HAB, Vorschrift 4a,	
Ø mit Ethanol 62 %o (m/m)]	33,3 mg

Sonstige Bestandteile siehe 6.1.

## 3. Darreichungsform

Tabletten

## 4. Klinische Angaben

### 4.1 Anwendungsgebiete

Die Anwendungsgebiete leiten sich von den homöopathischen Arzneimittelbildern ab. Dazu gehören: Nervöse Störungen.

### 4.2 Dosierung und Art und Dauer der Anwendung

Schulkinder von 6 bis 11 Jahren erhalten jeweils 2 x täglich 1 Tablette.

Jugendliche ab 12 Jahren und Erwachsene erhalten jeweils 3 x täglich 1 Tablette.

dysto-loges® S Tabletten lässt man vor den Mahlzeiten langsam im Mund zergehen.

Bei Besserung der Beschwerden ist die Häufigkeit der Anwendungen zu reduzieren.

#### Hinweis:

Bei besonders empfindlichen Personen und ausgeprägten Hypotonikern kann eine niedrigere Dosis geraten sein.

Auch homöopathische Arzneimittel sollten ohne ärztlichen Rat nicht über längere Zeit eingenommen werden.

### 4.3 Gegenanzeigen

dysto-loges® S Tabletten dürfen nicht eingenommen werden, bei einer Überempfindlichkeit (Allergie) gegen Wirkstoffe oder einen der sonstigen Bestandteile von dysto-loges® S Tabletten.

### 4.4 Besondere Warnhinweise und Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung

Dieses Arzneimittel enthält Lactose.

Patienten mit der seltenen hereditären Galactose-Intoleranz, Lactase-Mangel oder Glucose-Galactase-Malabsorption sollten dysto-loges® S Tabletten nicht einnehmen.

### 4.5 Wechselwirkungen mit anderen Arzneimitteln und sonstige Wechselwirkungen

Es wurden keine Wechselwirkungsstudien durchgeführt.

Bisher sind jedoch keine Wechselwirkungen bekannt geworden.

### Allgemeiner Hinweis:

In der Homöopathie ist bekannt, dass die Wirkung eines homöopathischen Arzneimittels durch allgemein schädigende Faktoren in der Lebensweise und durch Reiz- und Genussmittel ungünstig beeinflusst werden kann.

### 4.6 Verwendung bei Schwangerschaft und Stillzeit

Zur Anwendung des Arzneimittels in Schwangerschaft und Stillzeit liegen keine ausreichend dokumentierten Erfahrungen vor. Es soll deshalb in Schwangerschaft und Stillzeit nur nach Rücksprache mit dem Arzt angewendet werden.

### 4.7 Auswirkungen auf die Verkehrstüchtigkeit und die Fähigkeit zum Bedienen von Maschinen

Es wurden keine Studien zu den Auswirkungen auf die Verkehrstüchtigkeit und die Fähigkeit zum Bedienen von Maschinen durchgeführt.

### 4.8 Nebenwirkungen

Keine bekannt.

#### Hinweis:

Es können vorübergehend Erstverschlimmerungen auftreten, in diesen Fällen sollte das Arzneimittel abgesetzt und ein Arzt konsultiert werden.

### 4.9 Überdosierung

Bei der Einnahme größerer Mengen Milchzucker-(Lactose) haltiger Arzneimittel, wie dysto-loges® S Tabletten, kann es bei Personen mit Milchzuckerunverträglichkeit (Lactoseintoleranz) zu Magen-Darm-Beschwerden kommen oder eine abführende Wirkung auftreten.

## 5. Pharmakologische Eigenschaften

### 5.1 Pharmakodynamische Eigenschaften

#### Pharmakotherapeutische Gruppe:

Homöopathisches Arzneimittel bei nervösen Störungen  
ATC-Code: V60

Die in dysto-loges® S Tabletten enthaltenen homöopathischen Einzelstoffe Passiflora (Passionsblume), Gelsemium (Gelber Jasmin), Reserpinum (aus der Schlangenzurzel), Coffea (Kaffeebaum), Veratrum (Nieswurzel) ergänzen sich, entsprechend ihrem homöopathischen Arzneimittelbild, in ihrer Wirkung.

Gelsemium sempervirens ist wirksam bei nervösen Störungen und Kopfschmerzen, Reserpinum bei Schwäche- und Verstimmlungszuständen. Coffea arabica und Passiflora incarnata sind in der Homöopathie bewährt bei Schlafstörungen, Passiflora zusätzlich auch bei Unruhezuständen. Gemütsleiden mit Antriebssteigerung sind ein Anwendungsgebiet für Veratrum album.

Die Wirkungen der einzelnen Bestandteile lassen sich in dem Anwendungsgebiet „nervöse Störungen“ zusammenfassen.

### 5.2 Pharmakokinetische Eigenschaften

Entfällt

### 5.3 Präklinische Daten zur Sicherheit

Entfällt

## 6. Pharmazeutische Angaben

### 6.1 Liste der sonstigen Bestandteile

Lactose, Magnesiumstearat [pflanzlich], Maisstärke

### 6.2 Inkompatibilitäten

Nicht zutreffend

### 6.3 Dauer der Haltbarkeit

5 Jahre

Das Verfallsdatum dieser Packung ist auf der Faltschachtel und dem Blister aufgedruckt.

dysto-loges® S Tabletten darf nach Ablauf des Verfallsdatums nicht mehr verwendet werden.

### 6.4 Besondere Vorsichtsmaßnahmen für die Aufbewahrung

Keine

### 6.5 Art und Inhalt des Behältnisses

OP mit 50 Tabletten 

N 1
-----

OP mit 100 Tabletten 

N 1
-----

OP mit 200 Tabletten 

N 2
-----

Unverkäufliches Muster mit 20 Tabletten

### 6.6 Besondere Vorsichtsmaßnahmen für die Beseitigung

Keine besonderen Anforderungen.

## 7. Inhaber der Zulassung

Dr. Loges + Co. GmbH  
Postfach 12 62  
21412 Winsen (Luhe)

Hausadresse:  
Schützenstr. 5  
21423 Winsen (Luhe)  
Telefon: 04171/707-0  
Telefax: 04171/707-125  
Internet: <http://www.loges.de>  
E-Mail: [dysto@loges.de](mailto:dysto@loges.de)

## 8. Zulassungsnummer

6331472.00.00

## 9. Datum der Erteilung der Zulassung/Verlängerung der Zulassung

25.10.2007

## 10. Stand der Information

November 2007

## 11. Verkaufsabgrenzung

Apothekenpflichtig

Zentrale Anforderung an:

Rote Liste Service GmbH

FachInfo-Service
------------------

Postfach 11 01 71

10831 Berlin