

## GEBRAUCHSINFORMATION: Information für den Anwender

### **ALOMIDE® SE**

1 mg/ml Augentropfen

Wirkstoff: Lodoxamid-Trometamol

**Lesen Sie die gesamte Packungsbeilage sorgfältig durch, denn sie enthält wichtige Informationen für Sie.**

**Dieses Arzneimittel ist ohne Verschreibung erhältlich. Um einen bestmöglichen Behandlungserfolg zu erzielen, müssen Alomide Augentropfen jedoch vorschriftsmäßig angewendet werden.**

- Heben Sie die Packungsbeilage auf. Vielleicht möchten Sie diese später nochmals lesen.
- Fragen Sie Ihren Apotheker, wenn Sie weitere Informationen oder einen Rat benötigen.
- Wenn sich Ihre Symptome verschlimmern oder keine Besserung eintritt, müssen Sie auf jeden Fall einen Arzt aufsuchen.
- Wenn eine der aufgeführten Nebenwirkungen Sie erheblich beeinträchtigt oder Sie Nebenwirkungen bemerken, die nicht in dieser Gebrauchsinformation angegeben sind, informieren Sie bitte Ihren Arzt oder Apotheker.

### **Diese Packungsbeilage beinhaltet:**

1. Was ist ALOMIDE SE und wofür wird es angewendet?
2. Was müssen Sie vor der Anwendung von ALOMIDE SE beachten?
3. Wie ist ALOMIDE SE anzuwenden?
4. Welche Nebenwirkungen sind möglich?
5. Wie ist ALOMIDE SE aufzubewahren?
6. Weitere Informationen

## 1. WAS IST ALOMIDE SE UND WOFÜR WIRD ES ANGEWENDET?

ALOMIDE SE ist ein Arzneimittel gegen allergische Beschwerden am Auge.

ALOMIDE SE Augentropfen wurden Ihnen zur Behandlung einer nichtinfektiösen Bindehautentzündung verschrieben, die wahrscheinlich durch einen Stoff ausgelöst wurde, auf den Ihre Augen allergisch reagieren.

Bei der Bindehautentzündung handelt es sich um eine Entzündung (Rötung, Reizung oder Schwellung) der Bindehaut, einer empfindlichen Schleimhaut, die die Innenseite der Augenlider und den vorderen Augapfel überzieht. Wenn Sie ALOMIDE SE wie von Ihrem Arzt verordnet anwenden, trägt es dazu bei, die Rötung, Schwellung oder Reizung Ihres Auges zu vermindern.

## 2. WAS MÜSSEN SIE VOR DER ANWENDUNG VON ALOMIDE BEACHTEN?

**Alomide darf nicht angewendet werden,** wenn Sie überempfindlich (allergisch) gegen den Wirkstoff oder einen der sonstigen Bestandteile von ALOMIDE SE sind.

### **Bei Anwendung von ALOMIDE SE mit anderen Arzneimitteln**

Wechselwirkungen mit anderen Arzneimitteln, die Sie vielleicht zusätzlich anwenden, sind unter Alomide nicht beobachtet worden. Bitte informieren Sie Ihren Arzt oder Apotheker, wenn Sie andere Arzneimittel anwenden bzw. vor kurzem angewendet haben, auch wenn es sich um nicht verschreibungspflichtige Arzneimittel handelt.

### **Schwangerschaft und Stillzeit**

Es liegen keine ausreichenden kontrollierten Studien an Schwangeren vor. Daher sollte Alomide während der Schwangerschaft nur nach strenger Indikationsstellung angewendet werden.

Es ist nicht bekannt, ob Lodoxamid in die Muttermilch übertritt. Da dies jedoch bei vielen Substanzen der Fall ist, ist Vorsicht beim Einsatz von ALOMIDE SE während der Stillzeit geboten

Fragen Sie vor der Anwendung aller Arzneimittel Ihren Arzt oder Apotheker um Rat.

### **Verkehrstüchtigkeit und das Bedienen von Maschinen**

Direkt nach der Anwendung von ALOMIDE SE kann es kurzfristig zu verschwommenem Sehen kommen. Sie sollten nicht am Straßenverkehr teilnehmen oder Maschinen bedienen, bevor diese Beeinträchtigung abgeklungen ist.

### Hinweis für Kontaktlinsenträger

Während der Behandlung von allergischen Erkrankungen mit ALOMIDE SE sollen keine Kontaktlinsen getragen werden.

## **3. WIE IST ALOMIDE SE ANZUWENDEN?**

Zur Anwendung am Auge.

Wenden Sie ALOMIDE SE immer genau nach der Anweisung in dieser Packungsbeilage an. Bitte fragen Sie bei Ihrem Arzt oder Apotheker nach, wenn Sie sich nicht ganz sicher sind.

### Erwachsene

Normalerweise wird ein Tropfen viermal täglich in regelmäßigen Abständen ins Auge getropft. Jedoch kann Ihr Arzt diese Anweisung verändern, wenn er dies in Ihrem Fall für angebracht hält. Ihre persönlichen Dosierungsempfehlungen werden auf einem Etikett auf der äußeren Packung des Medikaments angegeben. Ist dies nicht der Fall oder wenn Ihnen etwas nicht klar ist, fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker. Wichtig ist, dass Sie ALOMIDE SE nach den Angaben Ihres Arztes anwenden und nicht mehr als die empfohlene Dosierung verwenden.

Die Anzeichen Ihrer Erkrankung (Rötung, Juckreiz) können sich unter ALOMIDE SE schnell bessern. Auch wenn eine Besserung eintritt, ist es wichtig, dass Sie ALOMIDE SE wie oben beschrieben weiter nehmen, solange Ihr Arzt dies empfiehlt, damit sich die Krankheitszeichen nicht wieder einstellen.

### Kinder

Bei Kindern über 4 Jahren entspricht die Dosierung der für Erwachsene.


Zur Anwendung bei Kindern unter 4 Jahren liegen keine Erfahrungen vor.

### Ältere Patienten


Bei älteren Patienten sind keine besonderen Vorsichtsmaßnahmen zu beachten

### Wie sollten Sie ALOMIDE SE anwenden?


Trennen Sie das Einzeldosisbehältnis durch leichtes Drehen und Ziehen vom Streifen ab.



Drehen Sie die Verschlusskappe ab. Durch das Abdrehen (nicht ziehen!) entsteht die saubere Tropföffnung.



Neigen Sie den Kopf leicht nach hinten, und richten Sie den Blick nach oben. Ziehen Sie mit dem Zeigefinger der freien Hand das Unterlid weg. Halten Sie das Einzeldosisbehältnis zum Eintropfen senkrecht über das Auge. Drücken Sie leicht mit den Fingern das Einzeldosisbehältnis bis sich ein Tropfen ablöst, ohne dass die Tropföffnung mit dem Auge oder Lidrand in Berührung kommt. Bei Bedarf benutzen Sie einen Spiegel.



Wenn Sie die Augentropfen in beiden Augen anwenden, wiederholen Sie die Schritte am anderen Auge.

**Wenn Sie eine größere Menge ALOMIDE SE angewendet haben, als Sie sollten**

Wenn Sie einmal zuviel des Arzneimittels angewendet haben, spülen Sie es mit warmem Wasser aus dem Auge.

Wenn Sie das Arzneimittel versehentlich geschluckt haben, wenden Sie sich umgehend an Ihren Arzt.

**Wenn Sie die Anwendung von Alomide vergessen haben**

Es ist wichtig, dass ALOMIDE SE regelmäßig angewendet wird. Wenn Sie eine Anwendung vergessen haben, setzen Sie die Behandlung mit der nächsten planmäßigen Anwendung fort. Tropfen Sie nicht die doppelte Dosis ein, um die versäumte Dosis nachzuholen.

**4. WELCHE NEBENWIRKUNGEN SIND MÖGLICH?**

Ihre Augen sind bereits entzündet und gereizt. Deshalb kann es sein, dass Sie nach dem Eintropfen von ALOMIDE SE Beschwerden verspüren, die sich folgendermaßen äußern können: Brennen, Stechen, Jucken, vermehrte Tränenbildung.

Es kann auch zu Reaktionen in anderen Körperregionen kommen wie z.B. zu Wärmegefühl oder aufsteigender Hitze oder zu Schwindelgefühl.

Informieren Sie bitte Ihren Arzt oder Apotheker, wenn eine der aufgeführten Nebenwirkungen Sie erheblich beeinträchtigt oder Sie Nebenwirkungen bemerken, die nicht in dieser Gebrauchsinformation angegeben sind.

**5. WIE IST ALOMIDE SE AUFZUBEWAHREN?**

Arzneimittel für Kinder unzugänglich aufbewahren.

Sie dürfen das Arzneimittel nach dem auf dem dem Umkarton und dem Behältnis nach „verw. bis“ angegebenen Datum nicht mehr anwenden. Das Verfalldatum bezieht sich auf den letzten Tag des Monats.

Nicht über 25° C lagern. Nicht gefrieren. Vor Licht geschützt (in der Faltschachtel) aufbewahren.

### **Hinweis auf Haltbarkeit nach Anbruch oder Zubereitung**

Der Inhalt des Behältnisses ist zum einmaligen Gebrauch bestimmt.

ALOMIDE SE enthält kein Konservierungsmittel. Daher sollten Sie die Einzeldosisbehältnisse erst unmittelbar vor Gebrauch öffnen und die evtl. nach der Anwendung verbleibende Restmenge nicht mehr verwenden.

Das Arzneimittel darf nicht im Abwasser oder Haushaltsabfall entsorgt werden. Fragen Sie Ihren Apotheker wie das Arzneimittel zu entsorgen ist, wenn Sie es nicht mehr benötigen. Diese Maßnahme hilft die Umwelt zu schützen.

## **6. WEITERE INFORMATIONEN**

### **Was ALOMIDE SE enthält**

Wirkstoff:

1 ml Lösung enthält:

Lodoxamid-Trometamol 1,78 mg  
(entsprechend 1 mg Lodoxamid)

Die sonstigen Bestandteile sind:

Natriumcitrat 2H<sub>2</sub>O, Mannitol, Hypromellose,  
Tyloxapol, Citronensäure-Monohydrat,  
Natriumhydroxid und/oder Salzsäure (zur Einstellung  
des pH-Wertes),  
gereinigtes Wasser.

### **Wie ALOMIDE SE aussieht und Inhalt der Packung**

Packungen mit 20 und 50 Einzeldosisbehältnissen zu 0,4 ml Augentropfen.

Je 5 Einzeldosisbehältnisse sind in einer Folie als Verdunstungsschutz versiegelt.

### **Pharmazeutischer Unternehmer**

Alcon Pharma GmbH  
Blankreutestraße 1  
79108 Freiburg

**Hersteller**

Laboratoires Alcon S.A.  
23 rue Georges Ferrenbach  
F-68240 Kayserberg

**Diese Gebrauchsinformation wurde zuletzt überarbeitet**  
**im**  
November 2008