

Gebrauchsinformation: Information für den Anwender

Eraxil® Creme
Creme 10 % Crotamiton

Wirkstoff: Crotamiton

Zur Anwendung bei Erwachsenen und Kindern

Lesen Sie die gesamte Packungsbeilage sorgfältig durch, denn sie enthält wichtige Informationen für Sie.

Dieses Arzneimittel ist ohne Verschreibung erhältlich. Um einen bestmöglichen Behandlungserfolg zu erzielen, muss Eraxil Lotio jedoch vorschriftsmäßig angewendet werden.

- Heben Sie die Packungsbeilage auf. Vielleicht möchten Sie diese später nochmals lesen.
- Fragen Sie Ihren Apotheker, wenn Sie weitere Informationen oder einen Rat benötigen.
- Wenn sich Ihre Beschwerden verschlimmern oder keine Besserung eintritt, müssen Sie auf jeden Fall einen Arzt aufsuchen.
- Wenn eine der aufgeführten Nebenwirkungen Sie erheblich beeinträchtigt oder Sie Nebenwirkungen bemerken, die nicht in dieser Gebrauchsinformation angegeben sind, informieren Sie bitte Ihren Arzt oder Apotheker.

Diese Packungsbeilage beinhaltet:

1. Was ist Eraxil Creme und wofür wird es angewendet?
2. Was müssen Sie vor der Anwendung von Eraxil Creme beachten?
3. Wie ist Eraxil Creme anzuwenden?
4. Welche Nebenwirkungen sind möglich?
5. Wie ist Eraxil Creme aufzubewahren?
6. Weitere Informationen

1. WAS IST ERAXIL CREME UND WOFÜR WIRD ES ANGEWENDET?

Eraxil Creme ist ein Antiscabiosum.

Eraxil Creme wird angewendet bei:

- Skabies

2. WAS MÜSSEN SIE VOR DER ANWENDUNG VON ERAXIL CREME BEACHTEN?

Eraxil Creme darf nicht angewendet werden,

- wenn Sie überempfindlich (allergisch) gegen Crotamiton oder einen der sonstigen Bestandteile von Eraxil Creme sind.
- wenn Sie akuten nässenden Hautauschlag (Akute exsudative Dermatitis) haben.

Besondere Vorsicht bei der Anwendung von Eraxil Creme ist erforderlich,

Achten Sie darauf, dass Eraxil Creme nicht mit der Augenbindehaut in Berührung kommt. Schleimhäute (Mund, Nase) sind beim Auftragen von Eraxil Creme auszusparen.

Bei ersten Anzeichen einer Überempfindlichkeitsreaktion sollten Sie Eraxil Creme nicht mehr anwenden. Befragen Sie Ihren Arzt, damit er gegebenenfalls über erforderliche weitere Maßnahmen entscheiden kann.

Kinder

Eraxil Creme ist für Kinder und Erwachsene gleichermaßen geeignet.

Bei Anwendung von Eraxil Creme mit anderen Arzneimitteln

Bitte informieren Sie Ihren Arzt oder Apotheker, wenn Sie andere Arzneimittel einnehmen / anwenden bzw. vor kurzem eingenommen / angewendet haben, auch wenn es sich um nicht verschreibungspflichtige Arzneimittel handelt.

Wechselwirkungen mit anderen Mitteln sind bisher nicht bekannt.

Schwangerschaft und Stillzeit

Eraxil Creme sollte nur nach sorgfältiger Abwägung des Nutzen-Risiko-Verhältnisses und unter Berücksichtigung von Alternativpräparaten während der Schwangerschaft und/oder der Stillperiode angewendet werden.

Fragen sie vor der Einnahme von allen Arzneimitteln Ihren Arzt oder Apotheker um Rat.

Verkehrstüchtigkeit und das Bedienen von Maschinen

Es sind keine besonderen Vorsichtsmaßnahmen erforderlich.

3. WIE IST ERAXIL CREME ANZUWENDEN?

Wenden Sie Eraxil Creme immer genau nach der Anweisung in dieser Packungsbeilage an. Bitte fragen Sie bei Ihrem Arzt oder Apotheker nach, wenn Sie sich nicht ganz sicher sind.

Falls vom Arzt nicht anders verordnet, ist die übliche Dosis:

Eraxil Creme sollte 1 mal täglich dünn auf die befallenen Hautpartien aufgetragen werden.

Die Anwendung sollten Sie an 3 bis 5 aufeinanderfolgenden Tagen wiederholen, bis Sie beschwerdefrei sind.

Wenn Sie weitere Fragen zur Anwendung des Arzneimittels haben, fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker.

Wenn Sie eine größere Menge angewendet haben, als Sie sollten

Überdosierungen sind nicht bekannt. Überschüssige Creme können Sie problemlos mit Wasser entfernen.

Wenn Sie weitere Fragen zur Anwendung des Arzneimittels haben, fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker.

4. WELCHE NEBENWIRKUNGEN SIND MÖGLICH?

Wie alle Arzneimittel kann Eraxil Creme Nebenwirkungen haben, die aber nicht bei jedem auftreten müssen.

Bei der Bewertung von Nebenwirkungen werden folgende Häufigkeitsangaben zugrunde gelegt:

Sehr häufig:	mehr als 1 Behandler von 10
Häufig:	1 bis 10 Behandelte von 100
Gelegentlich:	1 bis 10 Behandelte von 1.000
Selten:	1 bis 10 Behandelte von 10.000
Sehr selten:	weniger als 1 Behandler von 10.000
Nicht bekannt:	Häufigkeit auf Grundlage der verfügbaren Daten nicht abschätzbar

Mögliche Nebenwirkungen:

In Einzelfällen kann es Überempfindlichkeitsreaktionen geben und es kann eine vorübergehende Rötung, verbunden mit Wärmegefühl auftreten.

Informieren Sie bitte Ihren Arzt oder Apotheker, wenn eine der aufgeführten Nebenwirkungen Sie erheblich beeinträchtigt oder Sie Nebenwirkungen bemerken, die nicht in dieser Gebrauchsinformation angegeben sind.

5. WIE IST ERAXIL CREME AUFZUBEWAHREN?

Arzneimittel für Kinder unzugänglich aufbewahren.

Sie dürfen das Arzneimittel nach dem auf dem Behältnis und der Faltschachtel nach <Verwendbar bis> angegebenen Verfallsdatum nicht mehr anwenden. Das Verfallsdatum bezieht sich auf den letzten Tag des Monats.

Das Arzneimittel darf nicht im Abwasser oder Haushaltsabfall entsorgt werden. Fragen Sie Ihren Apotheker wie das Arzneimittel zu entsorgen ist, wenn Sie es nicht mehr benötigen. Diese Maßnahme hilft die Umwelt zu schützen.

6. WEITERE INFORMATIONEN

Was Eraxil Creme enthält:

Der Wirkstoff ist: Crotamiton

Die sonstigen Bestandteile sind:

Benzylalkohol, Wasserfreie Citronensäure, Gereinigtes Wasser, Isopropylmyristat (Ph.Eur.), Natriumcitrat 2H₂O, Methylcellulose, Macrogolstearat 5000, Glycerolmonostearat, Parfümöl Lonicera PH 799916

Wie Eraxil Creme aussieht und Inhalt der Packung:

Eraxil Creme ist eine weiße bis cremefarbene Creme mit aromatischem Geruch
Eraxil Creme ist in Packungen mit 40 g Creme und als Bündelpackung mit
80 g (2 x 40 g) Creme erhältlich.

Pharmazeutischer Unternehmer

gepepharm GmbH
Josef-Dietzgen-Straße 3
53773 Hennef
Tel.: 02242-8740200
Fax.: 02242-8740299
Email: gepepharm@gepepharm.de

Hersteller

biomo pharma GmbH,
Josef-Dietzgen-Straße 3
53773 Hennef

Diese Gebrauchsinformation wurde zuletzt genehmigt im 05/2008.