

Liebe Patientin, lieber Patient!

Bitte lesen Sie folgende Gebrauchsinformation aufmerksam, weil sie wichtige Informationen darüber enthält, was Sie bei der Anwendung dieses Arzneimittels beachten sollen. Wenden Sie sich bei Fragen bitte an Ihren Arzt oder Apotheker.

Gebrauchsinformation

DEXPA-nasal[®]

Wirkstoff: Dexpanthenol

Zusammensetzung:

10 g Nasencreme enthalten:

Arzneilich wirksamer Bestandteil:

Dexpanthenol 0,5 g

Sonstige Bestandteile: Wollwachsalkohole, Cetylstearylalkohol, Weißes Vaseline, Oleyloleat, Kaliumdihydrogenphosphat, Gereinigtes Wasser.

Nasencreme, Originalpackung mit 10 g

Topisches Rhinologikum



NESTMANN Pharma GmbH

Weiheweg 17

D-96199 Zapfendorf/Bamberg

Tel. 09547/92210 Fax 09547/215

Anwendungsgebiete:

Zur unterstützenden Behandlung der Heilung von Haut- und Schleimhautläsionen, wie sie auftreten können bei Rhinopathia vasomotorica, Rhinitis sicca, Rhinitis atrophicans, Pharyngitis sicca und Rhinopharyngitis.

Gegenanzeigen:

Keine bekannt.

Was müssen Sie während der Schwangerschaft und Stillzeit beachten?

Bei fachgerechter Anwendung kann DEXPA-nasal[®] während der Schwangerschaft und Stillzeit angewendet werden.

Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung und Warnhinweise:

Was müssen Sie vor der Anwendung von DEXPA-nasal[®] beachten?

Wichtige Warnhinweise über bestimmte Bestandteile von DEXPA-nasal[®]:

Cetylstearylalkohol kann örtlich begrenzt Hautreizungen (z.B. Kontaktdermatitis) hervorrufen.

Wechselwirkungen mit anderen Mitteln:

Keine bekannt.

Dosierungsanleitung, Art der Anwendung:

Wie oft und in welcher Menge sollten Sie DEXPA-nasal[®] anwenden?

Soweit nicht anders verordnet, 2- bis 3mal täglich ein erbsengroßes Stück Nasencreme in jedes Nasenloch einbringen.

Wie sollten Sie DEXPA-nasal[®] anwenden?

Die Nasencreme wird direkt mit Hilfe der Applikationsspitze oder auf einem Wattestäbchen in das Nasenloch eingebracht.

Wie lange sollten Sie DEXPA-nasal[®] anwenden?

Die Nasencreme wird bis zur vollständigen Abheilung angewendet.

Hinweise für den Fall der Überdosierung:

Keine Maßnahmen erforderlich.

Nebenwirkungen:

In Einzelfällen Unverträglichkeitsreaktionen gegen den Wirkstoff oder einen der sonstigen Bestandteile.

Wenn Sie Nebenwirkungen bei sich beobachten, die nicht in dieser Packungsbeilage aufgeführt sind, teilen Sie diese bitte Ihrem Arzt oder Apotheker mit.

Hinweise und Angaben zur Haltbarkeit des Arzneimittels:

Nach Ablauf des auf Behältnis und äußerer Umhüllung angegebenen Verfalldatums soll das Präparat nicht mehr angewendet werden.

Die Haltbarkeit nach Öffnung des Behältnisses beträgt 1 Monat.

Nicht über + 25 °C lagern.

Stand der Information:

Oktober 2004