

Wijzigingen Kunst van het Dosereren, december 2018

Locatie	Tekst	Aard van de wijziging
Hoofdstuk 13 Pag. 162 Tabel 13.3	<p>Onder de kop: Zwangerschap</p> <p>Het advies is om de vrouw vitamine K te geven, over de hoeveelheid bestaat geen consensus.</p> <p>Bij acenocoumarol 1-3 dagen 5-10 mg vitamine K per dag en bij fenprocoumon langer, een tot drie weken.</p> <p>Hierdoor wordt de concentratie van de vitamine K-afhankelijke stollingsfactoren verhoogd, evenals die van osteocalcine dat noodzakelijk is voor de ontwikkeling van bot en kraakbeen.</p> <p>De concentratie van de VKA in het bloed daalt niet sneller door de vitamine K. Daarom moet vitamine K langere tijd worden gegeven, zeker bij fenprocoumon.</p>	<p>Vervangen door :</p> <p>Het advies is om de vrouw vitamine K te geven, over de hoeveelheid bestaat geen consensus bij gebrek aan ondersteunende bewijslast.</p> <p>Bij acenocoumarol wordt aangeraden tenminste 1-3 dagen 5-10 mg vitamine K per dag te suppleren en bij fenprocoumon in verband met de halfwaardetijd langer namelijk 5 dagen.¹⁶⁻¹⁸</p> <p>De concentratie van de VKA in het bloed daalt niet sneller door de vitamine K. Daarom moet vitamine K langere tijd worden gegeven, zeker bij fenprocoumon. Mogelijk is het continueren van suppletie gedurende een week tot 10 dagen verstandig om eventuele tekorten ontstaan door langdurige VKA behandeling aan te vullen.</p> <p>Door toediening van vitamine K wordt de concentratie van de vitamine K-afhankelijke stollingsfactoren verhoogd, evenals die van osteocalcine dat noodzakelijk is voor de ontwikkeling van bot en kraakbeen.</p>