

Wijzigingen Kunst van het Doseren, november 2015

Locatie	Tekst	Aard van de wijziging
Hoofdstuk 3, Pag. 59	Naast de VKA moet het LMWH minimaal 5 dagen worden gegeven en mag pas worden gestaakt als de INR-waarde achtereenvolgens tweemaal in de therapeutische range ligt met een tussenperiode van minimaal 24 uur	Tekst 'in de therapeutische range..' is gewijzigd in: '.. boven de ondergrens van de therapeutische range...'
Hoofdstuk 3 Pag. 64	<p>Als er bij de start van de VKA ook een LMWH wordt voorgeschreven, moet de LMWH minimaal 5 dagen subcutaan worden gespoten en deze mag pas worden gestaakt als de INR-waarde achtereenvolgens tweemaal in de therapeutische range ligt met een tussenperiode van minimaal 24 uur.</p> <p>Als de INR-waarde boven de therapeutische range ligt tijdens het gebruik van een LMWH, is een algemeen advies om de toediening van de LMWH te continueren en de INR omlaag te brengen.</p>	<p>De tekst 'tweemaal in de therapeutische range' gewijzigd in: ' ' tweemaal boven de ondergrens van de therapeutische range</p> <p>Tekst gewijzigd naar: Als tijdens het gebruik van een LMWH de INR snel stijgt en boven de bovengrens van de therapeutische range komt dan dient de INR naar beneden te worden bijgesteld.</p> <p>Toegevoegde tekst: Hierbij zal, zeker bij gebruik van fenprocoumon, toediening van een geringe hoeveelheid vitamine K (1-3 mg) overwogen moeten worden. Omdat er in deze situatie sprake is van een instabiele instelling en er geen zekerheid is over het verloop van de INR in de komende dagen dient de LMWH, dus ondanks dat de INR boven de streefwaarden ligt, te worden voortgezet totdat de INR redelijk stabiel is. Hierbij kan, zeker bij een hoge INR overwogen worden één toediening van de LMWH over te slaan. Er dient naar gestreefd te worden de periode van gebruik van de combinatie van VKA en LMWH zo kort mogelijk te houden, uiteraard met tenminste 5 dagen overlap.</p>
Hoofdstuk 11, Pag. 133	Intramusculaire injecties met een volume \leq 1ml kunnen in de bovenarm Alle vaccinaties mits \leq 1 ml kunnen i.m. worden verricht, mits de antistolling stabiel is ingesteld.	Teken '<' gewijzigd in ' \leq ':