

Wijzigingen Kunst van het Doseren, april 2016

Locatie	Tekst	Aard van de wijziging
Gehele document	Verwijderen begrip streefgebied(en) en aanpassing therapeutische ranges (incl. tabel 2.2)	Therapeutische range 1 ^e intensiteitsgroep 2.0-3.0 Therapeutische range 2 ^e intensiteitsgroep 2.5-3.5
Hoofdstuk 2, Pag. 51	Diepzeeduiken is gecontra-indiceerd voor patiënten die een VKA gebruiken ^{21,22}	Diepzeeduiken is in de regel gecontra-indiceerd voor patiënten die een VKA gebruiken, er is momenteel niet voldoende wetenschappelijke informatie om met volledige zekerheid een verhoogd bloedingsrisico uit te sluiten. ^{21, 22} Klik hier voor de Richtlijn 'Duiken met trombocytenuitremmers of anticoagulantia'. http://www.duikgeneeskunde.nl/live201205/download/richtlijnen/Duiken_met_Trombocytenuitremmers_of_anticoagulantia_mrt2012.pdf
Hoofdstuk 3, Pag. 58	Gedurende de toediening van een LMWH moet de INR 2 a 3 maal per week worden gecontroleerd. Een laboratoriumcontrole (anti-Xa-spiegel) bij het gebruik van de LMWH' s is niet noodzakelijk, maar het wordt wel aanbevolen bij zwangerschap, nierinsufficiëntie of extreme obesitas, waarbij eventueel (subcutane of intraveneuze) ongefractioneerde heparine kan worden toegediend in plaats van een LMWH. ⁴	Gedurende de toediening van een LMWH, naast een VKA, moet de INR 2 a 3 maal per week worden gecontroleerd. Een laboratoriumcontrole (anti-Xa-spiegel) bij het gebruik van de LMWH' s is niet noodzakelijk, maar het wordt wel aanbevolen bij zwangerschap, nierinsufficiëntie of extreme obesitas. ⁴
Hoofdstuk 5, Pag. 80-82	Tabel 5.1	Geheel aangepast n.a.v. de nieuwe therapeutische ranges 2.0-3.0 en 2.5-3.5 voor resp. de 1 ^e en 2 ^e intensiteitsgroep