



FNT Normbesluiten oktober 2020

Normbesluiten	Inhoud	Datum LV vaststelling
Praktijkrichtlijn	Aanvullende FNT-normen op ISO-normen	08-10-2020
FNT-normen	Norm 1 t/m 5	08-10-2020
Veldnorm	Totale FNT toetsingskader	08-10-2020
FNT Kwaliteitsindicatoren 2020	Nieuwe indicatoren vastgesteld: 1) Op trombosedienstniveau, groep A, moet de TTR van de 1ste intensiteitsgroep minimaal 69,7% en voor de 2e intensiteitsgroep 57,8% zijn Op patiëntniveau mag maximaal 16,9% van de totale populatie (groep A) minder dan 50% binnen de range verkeren.	08-10-2020
Bloedafname en doseren door ander dan de thuishemodialyse (ongewijzigd gereviseerd)	Wie doseert er als de INR is bepaald door een andere dan reguliere trombosedienst	08-10-2020
FNT Kwaliteitsindicatoren 2019	Nieuwe indicatoren vastgesteld: 2) Op trombosedienstniveau, groep A, moet de TTR van de 1ste intensiteitsgroep minimaal 67,2% en voor de 2e intensiteitsgroep 57,3% zijn 3) Op patiëntniveau mag maximaal 19,4% van de totale populatie (groep A) minder dan 50% binnen de range verkeren.	08-10-2019
NPT protocol	Training en toetsing VVT-medewerker	20-6-2019
Protocol voor zelfmeten en zelf-doseren	<ul style="list-style-type: none">• Proces rondom duplo-meting• Eenduidig gebruik begrippen wegzendtermijn, controletermijn, controlebezoek• Procedure rondom 'uitbijter'	20-6-2019

Richtlijn: Toetsing bekwaamheid bloedafname t.b.v. INR bepaling	Vervangt Richtlijn: Toetsing Bekwaamheidsverklaring venapunctie	05-02-2019
Wegzendtermijn Zelfmeters en zelfdoseerders	Tijdens de eerste vijftien (15) maanden (eerst drie maanden training en dan twee controles met een controletermijn van zes maanden) is de maximale wegzendtermijn drie (3) weken. Na vijftien maanden wordt gekeken of dezelfde maximale wegzendtermijn gehanteerd kan worden als bij reguliere patiënten.	06-12-2018
FNT Kwaliteitsindicatoren 2018	Nieuwe indicatoren vastgesteld: 1) Op trombosedienstniveau, groep A, moet de TTR van de 1ste intensiteitsgroep minimaal 69,3% en voor de 2e intensiteitsgroep 60,6% zijn 2) Op patiëntniveau mag maximaal 15,5% van de totale populatie (groep A) minder dan 50% binnen de range verkeren.	06-12-2018
Patiëntgroepen	De driedeling instel-, shortterm- en longtermpatiënten is vervangen door een tweedeling: Groep A = alle patiënten Groep B = de eerste drie maanden van behandeling van alle patiënten	08-02-2018
Wegzendtermijn reguliere patiënt bij wie via POCT bloed wordt afgenomen	Maximale wegzendtermijn: 6 weken	06-10-2015

Disclaimer, ten behoeve van het document Normbesluiten.

“De Kwaliteitscommissie wijst er met nadruk op dat de bovengenoemde Normbesluiten een beperkte selectie van de FNT besluiten betreffen. Alle FNT besluiten worden weergegeven achter de inlog voor Trombosediensten. Dit is het ‘leidende overzicht’ waarin wordt verwezen naar de Ledenvergaderingen waarin het betreffende besluit is genomen.”

